

Свяжитесь с графом

Считаем ребра, вершины и компоненты без циклов. Обозначим в графе V – число вершин, P – число ребер, C – число компонент связности.

Факт 1. а) В дереве (то есть связном графе без циклов) $V=P+1$.

б) В графе без циклов $V=P+C$

Факт 2. а) В связном графе $P \geq V-1$. **б)** В любом графе $P \geq V-C$.

1. Какое наибольшее число рёбер можно перекусить в проволочном каркасе куба так, чтобы каркас не развалился на части?
2. Дан связный граф, где вершин не больше чем рёбер. Докажите, что можно удалить ребро так, чтобы граф остался связным.
3. В многоугольнике проведены все диагонали из одной вершины. Стороны и проведенные диагонали раскрасили в жёлтый и красный цвета так, что жук может проползти из любой вершины в любую другую по жёлтым отрезкам. Докажите, что есть две вершины, между которыми жук не может проползти по красным отрезкам.
4. Из спичек сложена шахматная доска. Жук через спичку не ползает. Убрав часть спичек внутри доски, получаем *лабиринт*. Назовем его *связным*, если жук может проползти между любыми двумя клетками. Каких лабиринтов можно получить больше: связных или не связных?

Увидеть граф за условием задачи помогают *выделенные* пары объектов, в частности, соседние объекты или клетки с общей границей. Выписывая для таких графов уравнения и неравенства для V , P , C , можно получать нетривиальные оценки.

5. Есть m болельщиков: некоторые из них (возможно, все или никто) болеют за «Спартак», а остальные – за «Динамо». Разрешается спросить у любых двоих, болеют ли они за разные команды, и они честно ответят «да» или «нет». Требуется посадить болельщиков в два автобуса так, чтобы в каждом были болельщики только одной команды. За какое минимальное количество вопросов это наверняка можно сделать?
6. Тетрадный лист раскрасили в 23 цвета по клеткам (при этом все цвета присутствуют). Пара цветов называется *хорошей*, если найдутся две соседние клетки, закрашенные этими цветами. Каково минимальное число хороших пар?
7. В классе 30 человек. За месяц было 29 дежурств, в каждом дежурила пара учеников. Докажите, что можно так выставить всем ученикам класса по одной оценке по 5-балльной шкале, что будет выставлена хотя бы одна пятерка, и в каждой паре дежуривших сумма оценок будет равна 8.
8. Дан клетчатый прямоугольник $m \times n$. Каждую его клетку разрезали по одной из диагоналей. На какое наименьшее число частей мог распасться прямоугольник?

На дом

- СГ1.** Куб со стороной $n \geq 3$ разбит перегородками на единичные кубики. Какое минимальное число перегородок между кубиками нужно удалить, чтобы из каждого кубика можно было добраться до границы куба?
- СГ2.** На клетчатой бумаге по границам клеток обведен тысячеугольник. Из какого наименьшего числа клеток он может состоять?
- СГ3.** Какое наибольшее число клеток доски 9×9 можно разрезать по обеим диагоналям, чтобы при этом доска не распалась на несколько частей?
- СГ4.** Есть 100 камней разного веса. За одно взвешивание можно про любые два камня узнать, который из них тяжелее. За какое наименьшее число взвешиваний можно наверняка определить самый тяжёлый камень?